

Insuline in der Übersicht (Seite 1 von 2)

	Kurz wirkende Analoginsuline	Normalinsulin (Altinsulin)	Lang wirkende Analoginsuline
Anwendung	Mahlzeiten/Korrektur	Mahlzeiten/Korrektur	Grundbedarf (Basal)
Handelsname/ Passende aktuelle Insulinpens zur Wieder- verwendung	Humalog® U 100 (Insulin lispro) HumaPen Savvio	Huminsulin® Normal HumaPen Savvio	Levemir® NovoPen Echo Plus, NovoPen 6 (Insulin detemir)
	Ljumjev® (Insulin ultra rapid lispro) HumaPen Savvio	Berlinsulin® H Normal HumaPen Savvio	Tresiba® NovoPen Echo Plus, NovoPen 6 (Insulin degludec)
	Liprolog® (Insulin lispro) HumaPen Savvio	Actrapid® NovoPen Echo Plus, NovoPen 6	Lantus® U 100 AllStar Pro, JuniorStar (Insulin glargin)
	Insulin lispro Sanofi® (Insulin lispro) AllStar Pro; JuniorStar		Abasaglar® HumaPen Savvio (Insulin glargin)
	NovoRapid® (Insulin aspart) NovoPen Echo Plus, NovoPen 6;		
	Fiasp® (Insulin faster aspart) NovoPen Echo Plus, NovoPen 6;		
	Insulin aspart Sanofi® (Insulin aspart) AllStar Pro; JuniorStar		
	Apidra® (Insulin glulisin) AllStar Pro, JuniorStar		
Besonderheiten			
Wirkungsbeginn nach	ca. 20-25 Minuten (Insulin lispro, Insulin aspart, Insulin glulisin); ca. 11-13 Minuten (Insulin ultra rapid lispro); ca. 15 Minuten (Insulin faster aspart)	ca. 30 - 60 Minuten	ca. 1 Stunde
Wirkungsmaximum nach	ca. 120-150 Minuten (Insulin lispro, Insulin aspart, Insulin glulisin); ca. 120 Minuten (Insulin ultra rapid lispro, Insulin faster aspart)	ca. 3 Stunden	ca. 7 - 9 Stunden (Insulin detemir) ca. 8 - 14 Stunden (Insulin degludec) ca. 8 - 12 Stunden (Insulin glargin)
Wirkungsdauer	ca. 4-5 Stunden (Insulin lispro, Insulin aspart, Insulin glulisin, Insulin ultra rapid lispro) ca. 4 Stunden (Insulin faster aspart)	ca. 8 Stunden	ca. 19 - 26 Stunden (Insulin detemir) ca. > 42 Stunden (Insulin degludec) ca. 20 - 27 Stunden (Insulin glargin)
Injektionsort	bevorzugt Bauch (auch Oberschenkel und Gesäß möglich)	Bauch	Bauch, Oberschenkel, Gesäß

Insuline in der Übersicht (Seite 2 von 2)

	Mischinsuline NPH / Analoginsulin	Mischinsuline NPH / Normalinsulin	NPH-Insuline
Anwendung	Grundbedarf (Basal)	Grundbedarf (Basal)	Grundbedarf (Basal)
Handelsname/ Passende aktuelle Insulinpens zur Wieder- verwendung	Humalog® Mix 50, HumaPen Savvio Humalog® Mix 25	Huminsulin® Profil III HumaPen Savvio	Huminsulin® Basal HumaPen Savvio
		Berlinsulin® H 30/70 HumaPen Savvio	Berlinsulin® H Basal HumaPen Savvio
	Liprolog® Mix 50 HumaPen Savvio Liprolog® Mix 25	Actraphane®50, NovoPen Echo Plus, Actraphane® 30 NovoPen 6	Protaphane® NovoPen Echo Plus, NovoPen 6
	Novo® Mix 30 NovoPen Echo Plus, NovoPen 6	Insuman® Comb 50, AllStar Pro, JuniorStar Insuman® Comb 15	
Besonder- heiten	Mischinsulin vor der Anwendung aufmischen. Dazu den Insulinpen ca. 20-mal vorsichtig auf den Kopf und zurück stellen. Nicht schütteln!	Mischinsulin vor der Anwendung aufmischen. Dazu den Insulinpen ca. 20-mal vorsichtig auf den Kopf und zurück stellen. Nicht schütteln!	Mischinsulin vor der Anwendung aufmischen. Dazu den Insulinpen ca. 20-mal vorsichtig auf den Kopf und zurück stellen. Nicht schütteln!
Wirkungs- beginn nach	ca. 20 - 25 Minuten	ca. 30 - 60 Minuten	ca. 1 - 2 Stunden
Wirkungs- maximum nach	ca. 2 - 3 Stunden	ca. 3 - 3,5 Stunden	ca. 6 - 7 Stunden
Wirkungs- dauer	ca. 10 - 14 Stunden	ca. 14 Stunden	ca. 14 Stunden
Injektionsort	Bauch (morgens – schnellere Wirkung); Oberschenkel, Gesäß (abends – langsamere Wirkung)	Bauch (morgens – schnellere Wirkung); Oberschenkel, Gesäß (abends – langsamere Wir- kung)	Bauch (morgens – schnellere Wirkung) Oberschenkel, Gesäß (abends – langsamere Wirkung)

DIASHOP liefert Ihren Diabetesbedarf nach Hause – zuzahlungsfrei

- Teststreifen, Pennadeln, Insulinpumpen- und CGM-Zubehör
- Versandkostenfrei Bestellung mit Rezept
- Diabetes-Fachgeschäft bundesweit (www.diashop.de/diabetes-fachgeschaeft)

Fordern Sie einen portofreien Rückumschlag für Ihr Rezept an.

Kostenfreie Servicenummer:



0800 / 99 00 88 0

www.diashop.de